

Tagetes patula

kisvirágú bársonyvirág

Felhasználás: Közkertjeinkbe legnagyobb tömegben ültethető, igénytelen növények a *Tagetes patula* fajták. Előnevelésük rövid idő alatt elvégezhető. Sok esetben virágzó állapotukban is ültethetőek.

Megtévesztő lehet azonban számos külföldi, igen korai, rendkívül miniatűr fajta használata, mert ezek nem regenerálódnak a szárazabb periódusok után.

Helyettük a robosztusabb, valamivel később virágzó magyar fajtákat ajánljuk, mert ezek egész nyáron át, különösebb gondozás és öntözés nélkül is virágoznak. Ezek valamivel (1-2 héttel) korábban vethetők, ha megvan a lehetőség az edzésre.

Nagy virágtömegükkel biztonságosabb, állandóan virágzó állományt érhetünk el mint a nagyvirágú *Tagetes erecta* fajtákkal.

Alkalmazható szegélynek, nagyobb csoportos ültetésként. Kő vagy műanyag edényekbe is jól alkalmazható és könnyen fenntartható.

Növénytársítás: A különböző sárga, narancsszín és kétszínű fajták egymás mellé ültetve is jól mutatnak, főleg ha a világos és sötét színűeket jól kombináljuk. Ugyancsak magasságukat figyelembe véve is ültethetők egymás mellé. Alacsonyakat szegélynek vagy előtérbe, magasakat háttérbe ültessük. Más fajok fajtái közül előtérbe kerülnek a kék illetve lila virágúak. Alacsony: *Verbena rigida* két színben: lila és porcelán. Magas: *Verbena bonariensis*. Félmagas és magas: *Salvia farinacea*. Ezekon kívül a piros színű más fajhoz tartozó fajtákkal is hatásosan harmonizálhatnak: *Gaillardia*, *Celosia*, *Salvia splendens*, *Verbena hybrida*. A sötétlombú növények kiváló társai a *Tagetes*-eknek (*Ocimum*, *Ricinus*). Ültethetők továbbá sötét virágú *Alcea* mellé, illetve elé. A sötét virágú *Rudbeckia* 'Őszifény'-nyel és 'Mackó'-val is harmonizálnak.

Nagyobb *Tagetes* felületbe jól mutat a szoliter kisebb-nagyobb csoport magasabb növény is (*Ocimum*, *Salvia farinacea*, *Kochia*, *Ricinus*, stb.).

Magszükséglet: 1000 palántához 6 g.

Vetés helye: Üvegházba. Tűzdelés kb. 100 növény/láda

Vetési idő: április elején. Korai vetés esetén gyenge, megnyúlt palántákat kapunk a fagyok elmúltáig.

Palántanevelési idő: 6 hét

Kiültetés: A fajták gyorsan fejlődnek - ugyanakkor fagyérzékenységük miatt csak május második felében ültethetőek.

Fagyérzékeny.

Növénytávolság: 'Vénusz': 20 cm; középmagasak: 30 cm; magasak: 35-40 cm

Fajta jele	Fajta	Szín	Magasság (cm)
TP-1	Csemő	kénsárga	30
TP-12	Robusztá	kénsárga	35
TP-14	Uránia	aranyárga	30
TP-15	Robusztá	aranyárga	35
TP-19	Vénusz	világos narancsszínű	25
TP-21	Korona	kénsárga	60
TP-22	Korona	aranyárga	60
TP-31	Orion	aranyárga, piros gallérral	35
TP-32	Tigris	sárga-piros csíkos	70
TP-40	Főnix	aranyárga	40



„Orion”



„Csemő”



„Vénusz”



„Korona”



„Tigris”